

## Recommandations pour l'allaitement d'enfants d'une fente labiale ou palatine

- 1** Certains enfants naissent avec une fente, un trou, un espace ou une fissure dans la lèvre ou un trou dans le palais (qui peut ne pas être visible de l'extérieur).



- 2** La chirurgie est très importante car sans elle, l'enfant peut ne pas parler correctement, il peut courir un plus grand risque d'infection et avoir de la difficulté à s'alimenter et à boire du lait.



- 3** Un chirurgien Smile Train peut réparer cette malformation sans frais dans un hôpital partenaire Smile Train. La chirurgie est le seul moyen de la réparer intégralement.



- 4** Pour être en santé et assez forts pour subir une chirurgie, il est important que les bébés porteurs d'une fente soient nourris de manière adéquate.



- 5** MAIS il est parfois difficile pour les bébés porteurs de fente de s'alimenter car le lait peut sortir par le nez et même passer dans les poumons. Ou les bébés peuvent aspirer de l'air et s'endormir le ventre plein même si leur alimentation est insuffisante.




- 6** Il est important que l'enfant soit bien nourri pour subir une chirurgie. La mère doit donc s'engager à trouver les stratégies d'allaitement qui fonctionnent pour elle et pour son bébé. Et il vaut mieux allaiter l'enfant à même le sein, si possible. Voici quelques stratégies :



Placez l'enfant en position assise pour l'allaiter.



Placez le mamelon du côté de la bouche qui n'est pas fendu.



Pressez délicatement le sein pour accroître le débit du lait.



Allaitez et faites faire le rot à l'enfant plus souvent que la normale.

- 7** Si l'allaitement au sein n'est pas possible, il est essentiel que la mère continue d'alimenter son enfant d'une autre façon. Voici quelques stratégies :




La mère peut extraire le lait de son sein et le donner à l'enfant à l'aide d'une cuillère ou d'un biberon.



La mère peut LÉGÈREMENT agrandir le trou de la tétine d'un biberon pour accroître le débit du lait.

- 8** Si aucun lait maternel n'est disponible, la mère peut employer du lait de vache ou du lait maternisé, en s'assurant de bien faire bouillir et refroidir le liquide.



- 9** Assurez-vous que tous les dispositifs d'allaitement sont bien nettoyés et stérilisés en les faisant bouillir pendant au moins 10 minutes afin de réduire le risque de fièvre ou d'infection.



- 10** N'oubliez pas d'amener votre bébé au centre Smile Train le plus près. Un médecin sur place examinera l'enfant et vous dira quand vous rendre à l'hôpital pour la chirurgie.

Et gardez à l'esprit que tous les traitements offerts dans un centre Smile Train sont gratuits à 100%.

