

Informação para os pais Durante a cirurgia de reparação de fissuras labio palatais

O seu filho vai ser submetido a uma cirurgia em breve para reparar uma fissura palatal ou lábil. Apesar da cirurgia de reparação de fissura ser uma intervenção de rotina, há sempre a possibilidade de haver uma complicação.



Diga ao seu médico da Smile Train se o seu filho mostrar sinais de uma constipação, tosse ou se tiver muito calor ou transpirar. Estes sintomas podem causar um grande risco para a saúde dele e de segurança durante e após a cirurgia.

Assegure que o seu filho não ingeriu **NENHUM** alimento ou bebida durante as 6 horas que precedem a cirurgia (nem água nem leite materno).



Alimentar uma criança antes da cirurgia pode levar a complicações potencialmente fatais como engasgamento ou vômitos durante a cirurgia.



Quando se encontrar com o seu filho após a cirurgia, ele/ela estará se recuperando e poderá parecer sonolento, chorar mais do que é costume, estar inchado ou ter algum sangue perto da ferida cirúrgica.



Depois da cirurgia do seu filho, NÃO tente dar NADA de comer, nem água nem leite materno, pois estes alimentos podem ir para os pulmões e causar engasgamento ou tosse. O seu médico dar-lhe-á instruções sobre quando pode alimentar o seu filho em segurança. **Na enfermaria, assegure que o seu filho está deitado de lado pois isso garante que ele (a) consiga respirar bem depois da cirurgia.**



Alerte o seu médico/enfermeiro se o seu filho mostrar algum sinal de dificuldade em respirar, hemorragia excessiva na ferida cirúrgica, de se sentir quente e a transpirar, vômitos, tontura extrema e se o tubo IV tiver saído do braço ou se a bolsa IV estiver vazia.



Quando o seu filho tiver alta do hospital, o seu médico ou enfermeira dar-lhe-ão instruções importantes para levar para casa, sobre como cuidar do seu filho em casa. Se reparar em algum problema depois de deixar o hospital traga o seu filho de volta para o hospital imediatamente para ser avaliado.



Em conjunto, os profissionais médicos e os pais podem ajudar a assegurar uma cirurgia segura e bem sucedida.

Reencaminhe outras crianças com fissuras labio palatais ao seu médico da Smile Train.